

**Liebe Patientin, lieber Patient!**

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Bei Fragen oder auftretenden Nebenwirkungen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

# BIOREMAL UR

## Homöopathisches Arzneimittel

**Zusammensetzung:**

**1 Tablette (550 mg) enthält arzneilich wirksame Bestandteile:**

Anagallis arvensis	Trit. D6	33,3 mg
Peumus boldo	Trit. D6	33,3 mg
Acidum hydrofluoricum	Trit. D8	33,3 mg
Sabadilla	Trit. D8	33,3 mg
Viscum album	Trit. D8	33,3 mg
Eupatorium perfoliatum	Trit. D10	33,3 mg
Helonias dioica	Trit. D10	33,3 mg
Acidum silicicum	Trit. D10	33,3 mg
Lachesis mutus	Trit. D15	33,3 mg

**Sonstige Bestandteile:** Lactose, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat  
Die Bestandteile werden über die letzten beiden Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40c gemeinsam potenziert.

1 Tablette enthält 480 mg Lactose entsprechend ca. 0,05 Broteinheiten.

**Darreichungsform und Packungsgröße:**

Originalpackung mit 50 Tabletten zum Einnehmen

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Wulf Rabe GmbH, Bunnenbergstr. 21, 30165 Hannover  
Tel.: 0511/35 036 54, Fax: 0511/35 036 52  
eMail: info@wulf-rabe.de, iNet: www.wulf-rabe.de

**Hersteller:** Pharma Funke GmbH, Fahnhorststr. 11, 46117 Oberhausen

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Hinweis:** Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

**Gegenanzeigen:**

Diese Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erblichen Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactosemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption leiden.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweis:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen sollte Bioremal WR in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

**Keine bekannt.**

**Allgemeiner Hinweis:** Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

## Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

**Soweit nicht anders verordnet:** Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Eine Tablette enthält 480mg Lactose. Dies ist bei Patienten mit Diabetis mellitus zu berücksichtigen.

## Nebenwirkungen:

**Keine bekannt.**

**Hinweis:** Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt/Therapeuten oder Apotheker mit.

## Hinweis zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

**Arzneimittel sorgfältig und für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

**Apothekenpflichtig**

**Stand der Information:**

Februar 2005



**Wulf Rabe GmbH**

eMail:post@wulf-rabe.de