

Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



Kephalodoron® 0,1%

Tabletten

1. Was ist Kephalodoron® 0,1% und wofür wird es angewendet?

Kephalodoron® 0,1% ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei gefäßbedingten Kopfschmerzen. Es enthält den Wirkstoff Ferrum-Quarz D2.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Kephalodoron® 0,1% und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Kephalodoron® 0,1% beachten?
3. Wie ist Kephalodoron® 0,1% einzunehmen.
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Kephalodoron® 0,1% beachten?

Kephalodoron® 0,1% Tabletten dürfen nicht angewendet werden

- bei Überempfindlichkeit gegen Weizenstärke oder einen der sonstigen Bestandteile.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei neu auftretenden, anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie die Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollten Kephalodoron® 0,1% Tabletten in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder

Bei Kindern unter 5 Jahren sollen Kephalodoron® 0,1% Tabletten nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.





Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Warnhinweise

Weizenstärke kann geringe Mengen an Gluten enthalten, die aber auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als verträglich gelten.


3. Wie ist **Kephalodoron® 0,1% einzunehmen?**

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 1 - 3 mal täglich 1 - 2 Tabletten, Kinder ab 5 Jahren: 1 - 3 mal täglich 1 Tablette.

Kephalodoron® 0,1% Tabletten werden unzerkaut mit Wasser eingenommen.

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 3 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung chronischer Erkrankungen erfordert eine Rücksprache mit dem Arzt.



Wenn Sie die Einnahme von Kephalodoron® 0,1% vergessen haben: Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Nehmen Sie Kephalodoron® 0,1% immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.

Wenn Kephalodoron® 0,1% Tabletten vor dem Schlucken zerkaut werden, kann es, bedingt durch den Gehalt an Eisen, zu einer Verfärbung der Zähne kommen und Metallgeschmack auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen

Die Tabletten sind feuchtigkeitsempfindlich. Nach jeder Entnahme muss das Behältnis daher wieder dicht verschlossen werden.

Zusammensetzung

1 Tablette enthält: Wirkstoff: Ferrum-Quarz Trit. D2 (HAB, SV 6) 20 mg.

(In 1 g Ursubstanz sind verarbeitet: Ferrum sulfuricum 0,64 g, Mel 0,32 g, Vitamin 0,02 g und Quarz 0,16 g.)

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Weizenstärke, Calciumbenenat.

Darreichungsform und Packungsgrößen

100 Tabletten, 250 Tabletten

Kephalodoron® Tabletten stehen auch in der Stärke 5% zur Verfügung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG

Postfach 1320

D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414

Fax: 07171 / 919-424

E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: Oktober 2006